

ለእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች

ለድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎች

ለድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ክረን - ያለ መከላከያ ወሲባዊ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ የማርገዝ እድልን ለመቀነስ የሚተቅም ዘዴ ነው።

ዘዴ	ለድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ክረን: ulipristal (UPA-EC)	ለድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ክረን: levonorgestrel (LNG-EC)	በማህጸን ውስጥ የሚቀመጥ መሳሪያ (IUD)
			
ውጤታማነት	100% ውጤታማ አይደለም - ቀደም ብሎ መውሰዱ በበለጠ ውጤታማ ይሆናል - LNG-EC ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ውጤታማ ነው።	100% ውጤታማ አይደለም - ቀደም ብሎ መውሰዱ በበለጠ ውጤታማ ይሆናል - LNG-EC ጋር ሲነጻጸር ውጤቱ አነስተኛ ነው።	ያለመከላከያ ወሲባዊ ግብኙነት እንደተፈጸመ በ5 ቀናት ውስጥ ካስገቡት 99% ውጤታማ ይሆናል።
ይህ ምንድን ነው?	አቫሪ እንቁላል እንዳያመርት ይከላከላል ወይም ያዘገያል	- አቫሪ እንቁላል እንዳያመርቱ ይከላከላል ወይም ያዘገያል - እንዲሁም እርግዝናን ለመከላከል የማህጸን አቀማመጥን ሊቀየር ይችላል።	- ትንሽ ፕላስቲክና የኮፐር እርግዝና መከላከያ መሳሪያ - ስፐሪም ከእንቁላል ጋር ተገናኝቶ እንዳያፈራ ያግደዋል
ይህን እንዴት ይጠቀማሉ?	ያለመከላከያ ወሲባዊ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ ወዲያውኑ መውሰዱ ጥሩ ነው	ያለመከላከያ ወሲባዊ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ ወዲያውኑ መውሰዱ ጥሩ ነው	በህኪም ወይም ልዩ ስልጠና ባገኘ አዋልጅ ነርስ በኩል በማህጸን ውስጥ መሳሪያውን IUD ለማስቀመጥ ቀጠሮ ያስይዙ

	• ያለመከላከያ ወሲባዊ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ እስከ አምስት ቀናት (120 ሰዓታት) መውሰዱ ይመረጣል • ጡት የሚያጠቡ ወይም አንዳንድ መድኃኒቶች የሚወስዱ ከሆነ ይህ አይመከርም። ስለዚህ ጉዳይ በፋርማሲ ሠራተኛ በኩል ምክር ይቀርብልዎታል።	• ያለመከላከያ ወሲባዊ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ እስከ ሶስት ቀናት (72 ሰዓታት) መውሰዱ ይመረጣል • በሁሉም እድሜ ገደብ ያሉ ሴቶች ይህን መውሰድ ይችላሉ።	• ከዚያም ቢያንስ እስከ አስር ዓመታት ባለበት ቦታ መቀመጥ ይችላል።
ይህን የት ማግኘት ይችላሉ?	• ያለ ህኪም ማዘዣ ወረቀት በፋርማሲዎች በኩል ይቀርባል	• ያለ ህኪም ማዘዣ ወረቀት በፋርማሲዎች ይቀርባል	• የህኪምና ቀጠሮ ይዘው ከሰለጠነ ጤና ባለሙያ ጋር ያገኙታል
ሌሎች ግምት ውስጥ የሚገቡ* * ማሳሰቢያ: በወሲባዊ ግንኙነት ለሚተላለፍ በሽታዎች (STIs) መከላከያ ኮንዶም ብቻ ነው።	• እንደ መደበኛ የርስዎ እርግዝና መከላከያ ዘዴ ተደርጎ መወሰድ የለበትም • ከ LNG-EC በላይ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል	• እንደ መደበኛ የርስዎ እርግዝና መከላከያ ዘዴ ተደርጎ መጠቀም የለበትም	• ለብዙዎች ሴቶች አስተማማኝ ሲሆን ምንም ልጅ ላልወለዱ ወጣት ሴቶችም ያካትታል።

በቪክቶሪያ መንግሥት ሥልጣን ያገኘና የታተመ፤ አድራሻ 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, የጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ፤ January 2019.
በድረገጽ <<http://healthtranslations.vic.gov.au/>> ላይ ቀርቧል።